



## وزارة الصحة – دولة الكويت

### جدول التطعيمات الأساسية لدولة الكويت - 2025

| السن عند التطعيم                  | نوع الطعم                                                                                                                                                                                                                            | طريقة الإعطاء                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحوامل                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>جرعة واحدة من طعم (دفتيريا . تيتانوس . سعال ديكى لا خلوي) خلال فترة الحمل الأول</li> <li>جرعة واحدة من طعم (دفتيريا . تيتانوس . سعال ديكى لا خلوي) عند كل حمل قادم</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>في العضل</li> <li>في العضل</li> </ul>                                           |
| خلال 24 ساعة من الولادة           | <ul style="list-style-type: none"> <li>الجرعة الأولى من طعم التهاب الكبدى ب</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>في العضل</li> </ul>                                                             |
| نهاية الشهر الثاني                | <ul style="list-style-type: none"> <li>الجرعة الأولى من طعم السداسي*</li> <li>الجرعة الأولى من طعم التهاب الرئوي (النيموكوكال)</li> <li>الجرعة الأولى من طعم الروتا**</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>في العضل</li> <li>في العضل</li> <li>بالفم</li> </ul>                            |
| نهاية الشهر الثالث                | <ul style="list-style-type: none"> <li>طعم الدرن (بي سي جي)</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>بالجلد تحت الكتف الأيسر</li> </ul>                                              |
| نهاية الشهر الرابع                | <ul style="list-style-type: none"> <li>الجرعة الثانية من طعم السداسي*</li> <li>الجرعة الثانية من طعم التهاب الرئوي (النيموكوكال)</li> <li>الجرعة الثانية من طعم الروتا</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>في العضل</li> <li>في العضل</li> <li>الفم</li> </ul>                             |
| نهاية الشهر السادس                | <ul style="list-style-type: none"> <li>الجرعة الثالثة من طعم السداسي*</li> <li>الجرعة الثالثة من طعم التهاب الرئوي (النيموكوكال)</li> <li>الجرعة الثالثة من طعم الروتا</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>في العضل</li> <li>في العضل</li> <li>بالفم</li> </ul>                            |
| عند استكمال السنة الأولى من العمر | <ul style="list-style-type: none"> <li>الجرعة الأولى من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة)</li> <li>الجرعة الأولى من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف</li> <li>الجرعة الأولى من طعم الجدري</li> <li>طعم السحايا المتقارن</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>نقطتان بالفم</li> <li>تحت الجلد</li> <li>تحت الجلد</li> <li>في العضل</li> </ul> |
| عند عمر سنة ونصف                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>الجرعة الثانية من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة)</li> <li>جرعة منشطة من طعم السداسي*</li> <li>جرعة منشطة من طعم التهاب الرئوي (النيموكوكال)</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>نقطتان بالفم</li> <li>في العضل</li> <li>في العضل</li> </ul>                     |
| عند عمر السنتين                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>الجرعة الأولى من طعم (الحصبة . النكاف . الحصبة الألمانية . الجدري)</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحت الجلد</li> </ul>                                                            |
| عند عمر ثلاث سنوات ونصف           | <ul style="list-style-type: none"> <li>جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتريا – تيتانوس – سعال ديكى لا خلوي) DTaP</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>في العضل</li> </ul>                                                             |
| من 4-6 سنوات (قبل دخول المدرسة)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>التأكد من الحالة التطعيمية للطفل واستكمال التطعيمات الناقصة (إن وجدت)</li> </ul>                                                                                                              |                                                                                                                        |
| من 10 – 12 سنة (بالمدارس)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتريا – تيتانوس – سعال ديكى لا خلوي) Tdap</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>في العضل</li> </ul>                                                             |
| من 16 – 18 سنة (بالمدارس)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتريا – تيتانوس – سعال ديكى لا خلوي) Tdap</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>في العضل</li> </ul>                                                             |

\* الطعم السداسي (دفتيريا , تيتانوس . سعال ديكى لا خلوي . كبدى B . شلل أطفال . هيروفيلس انفلونزا نوع b)

\*\* يتم إعطاء 2 أو 3 جرعات من لقاح الروتا حسب نوع اللقاح المستخدم

قطاع الصحة العامة – وزارة الصحة